



Wie lange setze ich welches blutverdünnende Medikament vor ESWL, Prostatastanzbiopsie oder urologischen Operationen am äußeren Genitale ab ?

- **ASS 100: 6 Tage** vor dem Termin absetzen.

Handelsnamen: Aggrenox, Asasantin, Aspirin, Docpelin, Dolomo, Dolopyrin, Doloversa, Doppel Spalt, Duoplavin, Eudorlin, Excedrin, Fibrex, Godamed, Grippostad, Herzass, Iltria, Melabon, Neuralgin, Neuranidal, Ratiopyrin, Spalt, Temagin, Thomapyrin, Thrombass, Titalgan, Togonal, etc.

- **Clopidogrel: 7 Tage** vor dem Termin absetzen.

Handelsnamen: Clopidogrel, Clopigamma, Grepid, Clopipuren, Duoplavin, Iscover, Plavix, etc.

- **Prasugrel: 7 Tage** vor dem Termin absetzen.

Handelsnamen: Prasugrel, Prasilt, Prasuhexal, Efiend, etc.

- **Ticagrelor: 6 Tage** vor dem Termin absetzen.

Handelsname: Brilique

- **Ticlopidin: 10 Tage** vor dem Termin absetzen.

Handelsnamen: Ticlopidin, Tiklid, Tiklyd, etc.

- **Apixaban: 48 Stunden** vor dem Termin absetzen.

Handelsname: Eliquis

- **Dabigatran: 48 Stunden** vor dem Termin absetzen.

Handelsname: Pradaxa

- **Rivaroxaban: 48 Stunden** vor dem Termin absetzen.

Handelsname: Xarelto

- **Marcumar:** Am Behandlungstag muß ein **schriftlich** vorliegender **Quick-Wert von 75% oder höher** bzw. **INR von 1,2 oder niedriger** vorhanden sein.

Handelsnamen: Falithrom, Marcumar, Marcuphen, Phenpro, Phemprocoumon, Phenprogramma, etc.

Ein erneute Einnahme der blutverdünnenden Medikation ist wieder möglich:

- 3 Tage nach ESWL
- 3 Tage nach Vasektomie (Sterilisation)
- 5 Tage nach Circumcision (Vorhautbeschneidung)
- 5-7 Tage nach Prostatastanzbiopsie